

**TEMA: ACARICIDAS**

---

Estoy en Santa Fe, zona próxima a Rosario, donde la cosecha no ha venido tan mal. En el relevamiento sanitario hecho por Senasa y el Programa Apícola Provincial el año pasado nos daba una presencia importante de nosemosis (recuerden lluvias de Marzo e inundaciones). En estos momentos se está terminando la cosecha y hay que curar contra varroa y algunos plantean la cura contra nosema, para lo cual vamos a hacer monitoreos. Me consultan si se puede curar simultáneamente y mi opinión es que no, dado que la cura contra varroa debe ser cuanto antes, pero estamos bajando a cámara y hay un poco de entrada, cuestión que el bloqueo se haga en forma natural y ese hecho puede hacer poco apetecible para la abeja tomar el jarabe con la fumagilina. Además desconozco como es la interacción entre los dos medicamentos, aunque uno es interno y el otro externo. Mariano, te ruego aclarar y ampliar estos conceptos.

Daniel Libonati ISA 5-21 Rosario  
Para ponerse en contacto con el emisor del mensaje:  
Daniel Libonati - [dlibonati@arnet.com.ar](mailto:dlibonati@arnet.com.ar)

.....

Estimado Daniel y todo el foro, les escribo por la consulta que efectuara Daniel Libonati en relación a la aplicación de Fugiprim en el mismo momento en que se aplica un tratamiento acaricida. Hasta el momento no se ha detectado ninguna alteración en la acción de la fumagilina ni de ninguno de los principios activos acaricidas al realizar ambos tratamientos al mismo tiempo. Para optimizar los tiempos y los costos operativos se recomienda hacerlos a la vez. Lo que no se sabe con certeza es la interacción que pueda tener la fumagilina si se suministra al mismo tiempo con algún suplemento proteico, quizás el activo pueda fijarse a las proteínas del suplemento, pero esto aún no fue comprobado científicamente.

Como bien dice Daniel, se debe tener en cuenta que será difícil que las abejas tomen el jarabe vehículo de la fumagilina si aún hay entrada natural en la zona. Para eso se sugiere demorar el tratamiento hasta que se reduzca la entrada y suministrar igual dosis en menor cantidad de jarabe para acelerar el tiempo de consumo. Me parece bien que hagan el tratamiento contra varroa lo antes posible, con lo cual se descarta la posibilidad de hacerlo junto al de nosemosis si aún hay entrada. Pero es buena la inquietud y seguramente muy frecuente encontrarse con este panorama.

Aquellos que puedan aportar algo más o hayan tenido experiencias exitosas o no frente a este tipo de diyuntivas, sería bueno que lo compartan.  
Saludos Mariano Bacchi  
SENASA

.....

Hola Mariano soy César Ruggeri de Mza.

Viste que nosotros aquí en la zona norte de la provincia llevamos dos años monitoreando el ácaro varroa y hemos observado que la curva avanza mucho en el periodo abril/mayo pasando el periodo normal de la cura de otoño y esto se debe a lo que no se produce un corte en la postura de la reina. Ello se debe que en Mza. los días son templados y muy frío por las noches, y se produce que los medicamentos no dan los resultados esperados, ni lo que indican los prospectos. "Entonces mi consulta es que si existe alguna planilla donde se indique a las temperaturas normales que los distintos medicamentos realizan su liberación y son eficaces, esto es para poder diseñar un cronograma de utilización y de cruzamientos". Sino tenemos la idea de ver si realizamos un tratamiento como se le realizan a los paquetes. Estoy recibiendo bien todos los informes, gracias. Saludos medios para que puedan tener este material. Gracias a todos!!!

Para ponerse en contacto con el emisor del mensaje:  
César Ruggeri - [mercesarkafabianba@yahoo.com](mailto:mercesarkafabianba@yahoo.com)

## TEMA: ACARICIDAS

---

Cesar, los productos veterinarios se registran después de superar pruebas de eficacias en condiciones normales. Si la liberación y la acción del producto están íntimamente relacionadas con la temperatura ambiente, cosa que ocurre con muchos productos orgánicos formulados en gel con ácido fórmico o timol, se aclara en sus marbetes comerciales las temperaturas adecuadas para su buen accionar y eficacia. Pero si la liberación del producto depende del contacto de las abejas con el soporte (sin vínculo directo con la temperatura ambiente), no es necesario que se aclare en el rótulo.

Aunque las temperaturas nocturnas sean muy bajas en la región, habiendo temperatura durante el día y con esto expansión del eventual bolo, no habría problemas en la acción del producto de contacto.

Si la curva de reproducción del ácaro aumenta mucho en abril-mayo es probable que se deba a varios factores, pero el más importante y el más preocupante es que esté fallando el tratamiento de fin de temporada. Si hacen un buen tratamiento inmediatamente después de la cosecha no debería ser muy alta la curva en otoño tardío.

De cualquier forma te sugiero comunicarte con el laboratorio fabricante para evacuar todo tipo de dudas, el Director Técnico de los elaboradores podrá evacuar esta o cualquier otra inquietud. Luego te pido, compartas la información con todos nosotros.

Gracias.

Saludos.

Mariano Bacci

SENASA

.....

Respecto de aplicar Fumagilina\*\*\* (cualquiera de las marcas conocidas) en jarabe a fin o principio de temporada con una entrada suave de néctar y otro producto de síntesis para Varroa; al aplicar los dos juntos estos han actuado bien sin problemas, salvo en el caso de que se aplique la fumagilina en jarabe en bolsitas arriba de los cuadros, en este caso he visto que algunos acaricidas no son llevados y algunas tablitas obstruidas, en el caso de alimentadores no hay problemas, es muy importante que el jarabe sea 2x1 (2 de azúcar x 1 de agua) preparar la dilución de la fumagilina en el momento de aplicar y en colmenar en cantidades que se usen en no mas de una hora para evitar los rayos solares (UV), no dar mas de 250 cm3 por colmenas y hacerlo por la mañana, de esta manera no he tenido problemas en San Luis, Tucumán, Entre Ríos y Cruz del Eje.

Espero sirva el aporte.

Atte Jorge Correa Isa 3-22.-

Para ponerse en contacto con el emisor del mensaje:

Jorge Rafael Correa <[jorgecorrea54@hotmail.com](mailto:jorgecorrea54@hotmail.com)>

\*\*\*Aclaración del moderador del Foro\*\*\*:

Fugiprim (MR) es en la actualidad el único producto aprobado por SENASA que posee fumagilina como principio activo en su composición.

.....